

Fiche de recherche

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – La Thécla du Bouleau

Chez certaines espèces, l'hiver constitue la meilleure période pour détecter leur présence. C'est le cas du Thécla du Bouleau (*Thecla betulae*). Ce papillon de jour est très discret à l'état adulte. Heureusement les œufs de ce papillon sont facilement détectables, pour peu que l'on sache où regarder...

Que rechercher ?

Œufs blanc pur avec un trou au milieu.

Sur les pieds de Prunellier (*Prunus spinosa*).

Rechercher à l'aisselle des branches, à la base d'une épine ou à la base d'un bourgeon. Préférentiellement sur les jeunes branches ou les jeunes pieds.

De quelques cm du sol à plusieurs mètres de haut.

Essentiellement exposés au sud, sud-est.

Autres plantes-hôtes : *Prunus padus*, *P. domestica* (Pruniers), *P. armeniaca* (Abricotier), *P. persica* (Pêchers), *P. avium* (Merisier).



Œufs de *Thecla betulae*

Où ?

A rechercher partout en Aquitaine dans :

- les haies,
- les bordures de boisements,
- les clairières et chemins forestiers,
- les coteaux embroussaillés,
- sur des pieds isolés en bordure de champs.

Préférentiellement exposé au sud.

Les œufs sont pondus isolément ou par groupe de 2 à 4, plusieurs sur le même pied de Prunellier.

Recherchez de préférence les jeunes repousses de Prunellier ou les jeunes branches sans lichens.



Haie arborée et arbustive et clairière forestière abritant des pieds de *Prunus spinosa*

Quand ?

Ponte dès Juillet, mais recherche optimale entre novembre et mars.

Comment ?

L'hiver, les pieds de Prunellier sont repérables grâce à leur écorce gris-rouge, la présence d'épines et un port arbustif.

Attention ! Plus on avance dans l'hiver et plus les œufs se dégradent et peuvent perdre leur blancheur.



▲ Œuf dégradé de *T. betulae*

Prunellier ▶

Risques de confusion ?

D'autres espèces de théclas pondent également sur le Prunellier : *Satyrrium pruni*, *S. acaciae*, *S. ilicis*.

Mais la couleur blanc pur (attention aux œufs dégradés) et un aspect d'oursin bombé avec un trou au milieu (et pas juste une dépression) permettent d'éviter les confusions.

En cas de doute et notamment dans les départements de la Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne, il est recommandé de nous envoyer un cliché de l'œuf pour confirmation.

Carte de répartition connue de *Thecla betulae* en Aquitaine

